

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
食道癌(C15)	AADC-0007	CDDP+5-FU療法(FP)	CDDP 10 mg/body day1からday5
			5Fu 500 mg/m <sup>2</sup> day1からday5
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
食道癌(C15)	AADC-0008	DCF療法	CDDP 80 mg/m <sup>2</sup> day1
			TXT 70mg/m <sup>2</sup> day1
			5Fu 800 mg/m <sup>2</sup> day1からday5
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
食道癌(C15)	AADC-0105	FP+IMRT療法	5-FU 500 mg/body day1からday5
			CDDP 5 mg/body day1からday5
			トモセラピー 2Gy/body day1からday5
			day6,7は休薬 6週連続 (到達目標60Gy)
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
食道癌(C15)	AADC-0164	DTX	DTX 70mg/m <sup>2</sup> day1
			3週ごと
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
食道癌(C15)	AADC-0184	IMRT+FP	CDDP 70 mg/m <sup>2</sup> day1
			5Fu 700 mg/m <sup>2</sup> day1からday5
			IMRT 50Gy 25分割
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食道炎、心嚢水貯留、胸水貯留、肺臓炎
食道癌(C15)	AADC-0185	FP	化学療法は4週毎に繰り返す
			CDDP 80 mg/m <sup>2</sup> day1
			5Fu 800 mg/m <sup>2</sup> day1からday5
食道癌(C15)	AADC-0227	PTX(6投2休)	PTX 100 mg/m <sup>2</sup> day1.8.15.22.29.36 少なくとも2週休薬
			副作用: 脱毛、発疹、爪の障害、感覚減退、味覚異常、浮動性めまい、疲労、浮腫、発熱、悪心・嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎、筋痛、関節痛
			骨髄抑制、末梢神経障害、間質性肺炎
食道癌(C15)	AADC-0233	Nedaplatin + 5-FU	Nedaplatin 90 mg/m <sup>2</sup> day1
			5Fu 800 mg/m <sup>2</sup> /day day1からday5
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、腎機能障害、口内炎、脱毛、肝機能異常、色素沈着、ショック、アナフィラキシー、電解質異常、間質性肺炎
食道癌(C15)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢、発熱
食道癌(C15)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 3mg/kg 2週間隔
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌(C16)	AADC-0002	S-1+CDDP療法	TS-1 3週投与2週休薬 TS-1開始8日目にCDDP60 mg/㎡ 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌(C16)	AADC-0003	PTX	a. 70 mg/㎡を1週に1回 3回投与 1週休薬 b. 80 mg/㎡を2週に1回 もしくは 3週に1回 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害 筋肉痛、関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常
胃癌(C16)	AADC-0006	CPT-11+ CDDP療法(IP)	CDDP 80 mg/㎡ day1 CPT-11 70 mg/㎡ day1,15 4週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感 末梢神経障害、脱毛
胃癌(C16)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/㎡ day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46~48hr l-LV 200mg/㎡ day1 2週ごと 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱
胃癌(C16)	AADC-0085	CPT-11	CPT-11 150 mg/㎡ 2週に1回 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、骨髄抑制、肝機能障害
胃癌(C16)	AADC-0101	外来 CPT-11+CDDP療法(IP)	CDDP 30 mg/㎡ day1,15 CPT-11 60 mg/㎡ day1,15 4週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感 末梢神経障害、脱毛
胃癌(C16)	AADC-0122	S-1+DTX療法	TS-1 2週投与1週休薬 朝食後および夕食後の1日2回 80 mg/㎡/day DTX 40 mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
胃癌(C16)	AADC-0134	XELOX療法	カペシタビン	1日2回 14日間内服7日間休薬
			体表面積	1.36㎡未満 1200mg/回
				1.36以上1.66㎡未満 1500mg/回
				1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回
			1.96㎡以上 2100mg/回	
			L-OHP	130mg/㎡ day1 3週ごと
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
胃癌(C16)	AADC-0150	tri-weekly Abiraterone	アブラキサシ	1回 260mg/㎡ 3週毎
			副作用:	脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
胃癌(C16)	AADC-0153	tri weekly Trastuzumab + XP療法	トラスツズマブ	8mg/kg day1 (2回目からは6mg/kg)
			CDDP	80 mg/㎡ day1
			カペシタビン	1日2回1回1000mg/㎡ day1夕からday15朝まで内服その後7日間休薬
				3週毎
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、下痢、口内炎、色素沈着 手足症候群、血中ビリルビン増加、腎機能障害、脱毛、末梢神経障害
胃癌(C16)	AADC-0154	DCS療法	TS-1	朝食後および夕食後の1日2回
				80 mg/㎡/day day1夕からday15朝まで内服その後14日間休薬
			DTX	35 mg/㎡ day1, day15
			CDDP	35 mg/㎡ day1, day15
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、腎機能障害、下痢
胃癌(C16)	AADC-0179	DTX	DTX	75mg/㎡ day1
				3週ごと
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害、間質性肺炎
胃癌(C16)	AADC-0213	SOX	L-OHP	130mg/㎡ day1 3週ごと
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 3週ごと
			体表面積	1.25㎡未満 40mg/回
				1.25から1.5㎡未満 50mg/回
				1.5㎡以上 60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック
胃癌(C16) 一次治療が無効の治癒切除不能胃癌	AADC-0219	RAM療法	RAM	8mg/kg day1 2週ごと
			副作用:	腹痛、高血圧、下痢、 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症
胃癌(C16) 一次治療が無効の治癒切除不能胃癌	AADC-0220	PTX+RAM療法	RAM	8mg/kg day1 2週ごと
			PTX	70mg/㎡ day1, 8 2週ごと
			副作用:	腹痛、高血圧、下痢、疲労、無力症、末梢性浮腫 口内炎、肝機能障害、呼吸困難、蛋白尿、発疹、皮膚乾燥 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低アルブミン血症、低ナトリウム血症、ざ瘡様皮膚炎 眼瞼浮腫、顔面浮腫、鼻出血

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
胃癌(C16)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 3mg/kg 2週間隔
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16)	AADC-0253	Weekly nab-PTX	nab-PTX 100mg/m <sup>2</sup> 週1回投与 3週連続投与1週休薬
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
胃癌(C16)	AADC-0206	Trifluridine	トリフルリジン 1回35mg/m <sup>2</sup> を1日2回
			5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間 副作用: 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎
GIST(C16~C17)	AADC-0009	Glivec	イマチニブ1日1回400mgを食後に投与
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、浮腫、発疹、倦怠感、電解質異常 肝機能障害、血中アルブミン減少
GIST(C16~C17)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ1日1回50mg
			4週間連続投与2週間休薬 副作用: 骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、菌肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
大腸癌(C18)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量 朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
大腸癌(C18)	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
大腸癌(C18)	AADC-0011	UFT(UFT-E)/LV療法	UFT-E 300mg/m <sup>2</sup> /日 1日3回に分けて
			LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用 4週投与 1週休薬 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
大腸癌(C18)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱
			2週ごと
大腸癌(C18)	AADC-0084	FOLFIRI療法	5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛
大腸癌(C18)	AADC-0092	Bevacizumab based mFOLFOX6療法	
			ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1
			L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クレーゼ
大腸癌(C18)	AADC-0093	Bevacizumab based FOLFIRI療法	
			ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1
			5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1
			CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> day1
			2週ごと
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クレーゼ
大腸癌(C18)	AADC-0099	5-FU/LV療法	
			5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1
			2週ごと
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛 全身倦怠感、肝機能障害、下痢
大腸癌(C18)	AADC-0102	Xeloda	
			カペシタビン 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			体表面積 1.33m <sup>2</sup> 未満 1500mg/回
			1.33から1.57m <sup>2</sup> 未満 1800mg/回
			1.57から1.81m <sup>2</sup> 未満 2100mg/回
			1.81m <sup>2</sup> 以上 2400mg/回
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎
大腸癌(C18)	AADC-0107	Bevacizumab based 5-FU/LV療法	
			ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1
			5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1
			2週ごと
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛 全身倦怠感、肝機能障害、下痢、高血圧性クレーゼ 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症
大腸癌(C18)	AADC-0108	UFT/LV+IMRT療法	
			UFT 300mg/m <sup>2</sup> /日 1日3回に分けて
			LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用
			トモセラピー実施日day1~5
			トモセラピー 2Gy/day (day1~5まで行い、day6,7は中止)
			4週連続投与(到達目標40Gy)
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
大腸癌(C18)	AADC-0109	Cetuximab + FOLFIRI 療法	セツキシマブ	初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> )	day1	週1回
			CPT-11	150mg/m <sup>2</sup> (75歳以上は120mg/m <sup>2</sup> )	day1	2週ごと
			I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	day1	2週ごと
			5-FU(bolus)	400mg/m <sup>2</sup>	day1	2週ごと
			5-FU(infusion)	2400mg/m <sup>2</sup>	46~48hr	2週ごと
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱、 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction		
大腸癌(C18)	AADC-0110	Cetuximab + CPT-11 療法	セツキシマブ	初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> )	day1	週1回
			CPT-11	150mg/m <sup>2</sup> (75歳以上は120mg/m <sup>2</sup> )	day1	2週ごと
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、 脱毛、疲労感、骨髄抑制		
大腸癌(C18)	AADC-0115	Cetuximab	セツキシマブ	初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> )	day1	週1回
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、 脱毛、疲労感、骨髄抑制		
大腸癌(C18)	AADC-0134	XELOX 療法	カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
			体表面積	1.36m <sup>2</sup> 未満	1200mg/回	
				1.36以上1.66m <sup>2</sup> 未満	1500mg/回	
				1.66以上1.96m <sup>2</sup> 未満	1800mg/回	
				1.96m <sup>2</sup> 以上	2100mg/回	
			L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	day1	3週ごと
副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着					
大腸癌(C18)	AADC-0135	Bevacizumab based XELOX 療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	3週ごと
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
			体表面積	1.36m <sup>2</sup> 未満	1200mg/回	
				1.36以上1.66m <sup>2</sup> 未満	1500mg/回	
				1.66以上1.96m <sup>2</sup> 未満	1800mg/回	
				1.96m <sup>2</sup> 以上	2100mg/回	
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	day1	3週ごと			
副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クレーゼ					
大腸癌(C18)	AADC-0136	IRIS(大腸)	CPT-11	125 mg/m <sup>2</sup>	2週ごと	
			TS-1	80~120mg/body	2週投与2週休薬	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、脱毛		
大腸癌(C18)	AADC-0140	Bevacizumab based XELODA 療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	3週ごと
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
			体表面積	1.36m <sup>2</sup> 未満	1200mg/回	
				1.36以上1.66m <sup>2</sup> 未満	1500mg/回	
				1.66以上1.96m <sup>2</sup> 未満	1800mg/回	
				1.96m <sup>2</sup> 以上	2100mg/回	
副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着					

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クレーゼ
大腸癌(C18)	AADC-0146	Panitumumab	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患
大腸癌(C18)	AADC-0147	Panitumumab based FORFIRI療法	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr I-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> (76才以上は120mg/m <sup>2</sup> ) day1 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、悪心・嘔吐、骨髄抑制 肝機能障害、脱毛
大腸癌(C18)	AADC-0148	Panitumumab based FOLFOX療法	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr I-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、発熱 末梢神経障害、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、
大腸癌(C18)	AADC-0168	Cetuximab based mFOLFOX6 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> ) day1 週1回 L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと 5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと 5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr 2週ごと I-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、
大腸癌(C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0191	Regorafenib	レゴラフェニブ 1日1回160mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す 副作用: 手足症候群、TEN、Stevens-Johnson症候群、多形紅斑 肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クレーゼ、可逆性後白質脳症 消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制 脱毛、掻痒、多汗症
大腸癌(C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0192	BV/SOX	ベバシズマブ 5mg/kg day1 3週ごと L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 3週ごと 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛、



がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
大腸癌(C18)	AADC-0206	Trifluridine	トリフルリジン
			1回35mg/m <sup>2</sup> を1日2回
			5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後
			14日間休む 1コース28日間
			副作用:
大腸癌(C18)	AADC-0213	SOX	L-OHP
			130mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと
			TS-1
			朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 3週ごと
			体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回
			1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回
			1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回
			副作用:
			骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック
大腸癌(C18)	AADC-0214	Panitumumab+5-FU/LV	パニツムマブ
			6mg/kg day1
			5-FU (bolus)
			400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion)
			2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			l-LV
			200mg/m <sup>2</sup> day1
			2週毎
			副作用:
			Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群
大腸癌(C18)	AADC-0215	Cetuximab+5-FU/LV	セツキシマブ
			初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> ) day1 週1回
			5-FU (bolus)
			400mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと
			5-FU (infusion)
			2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr 2週ごと
			l-LV
			200mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと
			副作用:
			Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症 末梢神経障害
大腸癌(C18)	AADC-0216	Panitumumab+CPT-11	パニツムマブ
			6mg/kg 点滴静注
			CPT-11
			150mg/m <sup>2</sup> (76才以上は120mg/m <sup>2</sup> ) day1
			2週毎
			副作用:
			Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛 腎機能障害、血栓塞栓症
大腸癌(C18)	AADC-0223	bevacizumab+XELIRI	ベバシズマブ
			7.5mg/kg day1
			CPT-11
			200mg/m <sup>2</sup> day1
			XELODA
			1600mg/m <sup>2</sup> /日 day1~14
			3週毎
			副作用:
			infusion reaction、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、高血圧性脳症 可逆性後白質脳症症候群、ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症 うっ血性心不全、間質性肺炎、神経障害、食欲減退、悪心、口内炎 脱毛、下痢、手足症候群、腎障害、色素沈着
大腸癌(C18)	AADC-0228	Bevacizumab + FOLFOXIRI	ベバシズマブ
			5mg/kg day1
			5-FU (infusion)
			3200mg/m <sup>2</sup> 46hr
			l-LV
			200mg/m <sup>2</sup> day1
			L-OHP
			85mg/m <sup>2</sup> day1
			CPT-11
			165mg/m <sup>2</sup> day1
			2週毎



がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			副作用: 骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症
大腸癌(C18)	AADC-0229	Capecitabine + IMRT	カペシタビン 1日2回 週5日 体表面積 1.31㎡未満 900mg/回 1.31以上1.64㎡未満 1200mg/回 1.64以上 1500mg/回 トモセラピー 2Gy/day day1-5実施、day6-7中止 最大50Gy (2Gy×25回 5週間)
			副作用: 骨髄抑制、手足症候群、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、腹痛 疲労、無力症、脱毛、皮膚の発赤、掻痒感
大腸癌(C18)	AADC-0230	RAM + FOLFIRI	ラムシルマブ 8mg/kg day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ day1~3 I-LV 200mg/㎡ day1 CPT-11 150mg/㎡ day1 2週毎
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛 口内炎、鼻出血、高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症 消化管穿孔
肛門管癌(C21.1)	AADC-0196	5-FU+MMC+RT	5-FU (infusion) 1000mg/㎡/day day1~4 29~32 MMC(bolus) 10mg/㎡/day day1,29 RT 1.8Gy/day 週5回 計33回 総線量 59.4Gy
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、体重減少、脱毛、口内炎 出血傾向、溶血性尿毒症症候群、腎障害、間質性肺炎、下痢、色素沈着 肝機能障害、アナフィラキシーショック、白質脳症、うつ血性心不全、手足症候群 食道炎、
肝癌(C22)	AADC-0017	Epirubicin 肝動注	1日60mg/㎡ を動脈内投与
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐
肝癌(C22)	AADC-0141	Miriplatin肝動注	1日1回70mg を肝動脈内投与(1回120mgを上限) 繰り返し投与する場合は4週間以上の観察期間をおく
			副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、発熱、投与部位の疼痛 腎機能障害、全身倦怠感
肝癌(C22)	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減
			副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クレーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
肝癌(C22)	AADC-0240	Lenvatinib	用法・用量 体重60kg以上 1日1回12mg経口投与 体重60kg未満 1日1回8mg経口投与
			副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
胆道癌(C22~24)	AADC-0001	S-1(CG)	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
胆道癌(C22~24)	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/㎡を2週間に1回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
胆道癌(C22~24)	AADC-0163	GC療法	GEM 1000mg/㎡ day1.8. CDDP 25mg/㎡ day1.8. 1クール:3週
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
膵癌(C25)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回
膵癌(C25)	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/㎡を2週間に1回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
膵癌(C25)	AADC-0143	GEM +IMRT療法	GEM 1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬 放射線照射 1.8Gy×28Fr total50.4Gy
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
膵癌(C25)	AADC-0159	Erlotinib+GEM療法	Erlotinib 100mg/day 連日経口投与 GEM 1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、ざ瘡様皮疹等の発疹、悪心・嘔吐、下痢 間質性肺炎
膵癌(C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0200	FOLFIRINOX	L-OHP 85mg/㎡ day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46hr I-LV 200mg/㎡ day1 CPT-11 180mg/㎡ day1 2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			発熱、脱毛、肝機能障害
<b>膵癌(C25)</b> 治癒切除不能膵癌	AADC-0212	GEM+nab-PTX	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1 nab-PTX 125mg/m <sup>2</sup> day1 3週投与1週休薬 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
<b>膵癌(C25)</b> 切除可能膵癌術前	AADC-0256	GEM+S-1(膵癌NAC)	GEM 1000 mg/m <sup>2</sup> day1.day8 30分かけて点滴静注 S-1 体表面積毎(80mg~120mg) 14日間 分2で内服 (day1の夕方からday15の朝まで) これを2コース繰り返す。 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 下痢、口内炎、色素沈着、発疹
<b>膵内分泌腫瘍(C25.4)</b>	AADC-0169	Everolimus	Everolimus 10mg/day 連日経口投与 副作用: 口内炎、発疹、下痢、疲労、末梢性浮腫、悪心・嘔吐、食欲不振 鼻出血、貧血、味覚障害、体重減少、頭痛、掻痒症、高血糖 血小板減少、無力症、間質性肺炎、腎不全、アナフィラキシー様症状 急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、深部静脈血栓症、好中球減少 悪性腫瘍(二次発癌)、皮膚乾燥、爪の障害、心嚢液貯留 進行性多巣性白室脳症、BKウイルス腎症、細胞蛋白症
<b>消化管神経内分泌腫瘍(C26.9)</b>	AADC-0188	サントスタチンLAR	サントスタチンLAR 1回30mgを4週毎に臀部筋肉内に注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位疼痛、胆石症、下痢
<b>膵・消化管神経内分泌腫瘍(C25.4、C26.9)</b>	AADC-0257	Lanreotide	Lanreotide 1回120mgを4週毎に深部皮下内に注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位疼痛、徐脈 胆石症、下痢、白色便
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50 mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/m <sup>2</sup> を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m <sup>2</sup> を2週間に1回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 200mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=6 day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			3週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0020	DTX + CDDP療法(DC)	DTX 60mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 3~4週ごと 副作用: 悪心・嘔吐、腎機能障害、神経毒性、聴覚障害、電解質異常、浮腫、倦怠感、味覚異常、爪の変形、骨髄抑制、脱毛
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0022	Iressa	250mgを1日1回経口投与 副作用: 下痢、皮膚乾燥症、ニキビ様皮疹、肝機能障害、間質性肺炎
<b>肺癌(C34)</b> 非細胞肺癌	AADC-0025	CPT-11	CPT-11 100mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 1週間隔で3回投与、1週休薬 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0091	tri-weekly DTX	DTX 60mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0098	CPT-11+CDDP療法(IP)	CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11 60mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振、末梢神経障害、脱毛、
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0106	Tarceva	エルロチニブ 150mg 1日1回経口投与 副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺炎、肝機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0111	VNR	ビンレルビン 25mg/m <sup>2</sup> day1.8 3週ごと(4クール以上、最大6クール)
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0114	Pemetrexed+ CDDP療法	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0119	CDDP+VNR+IMRT療法	CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day2 VNR 20mg/m <sup>2</sup> day2、9 4週ごと 4コース 放射線療法 2Gy/日 5回/週 計6週30回60Gy (化学療法1コース目のday3から開始) 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感、腎機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0149	Bevacizumab based TC療法	PTX 200mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間隔で4~6サイクル実施後、アバスチン単独を

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			3週間間隔で投与する
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0151	CDDP+VNR療法	CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day2 VNR 25mg/m <sup>2</sup> day2、9 4週ごと 4コース 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感 腎機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0170	Pemetrexed	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 4コース 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0180	CBDCA+Pemetrexed	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週毎 4コース 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
<b>肺癌(C34)</b> ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌 ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌	AADC-0176	Crizotinib	Crizotinib 1回250mg日2回内服 副作用: 悪心・嘔吐、視力障害、下痢、便秘、末梢性浮腫、間質性肺炎 肝機能障害、QT間隔延長、骨髄抑制
<b>肺癌(C34)</b> 進行性非扁平非小細胞肺癌	AADC-0181	PEM+CBDCA+BV followed by PEM+BV	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ペバシズマブ 15mg/kg day1 3~4週毎4コース後 CR、PR、SDなら維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 ペバシズマブ 15mg/kg day1 3週毎PDになるまで継続 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0186	CBDCA+S-1療法	CBDCA 目標AUC=5 day1 TS-1 80~120mg/body day1~14 3週毎 副作用 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 神経障害、関節痛、脱毛
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0189	IMRT+CBDCA	CBDCA 30mg/m <sup>2</sup> day1~day5 IMRT 2Gy/日 day1~day5 1週毎 CBDCAは4週間実施、IMRTは6週間実施 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害 アナフィラキシー様症状、間質性肺炎、急性腎不全、肝不全、 消化管壊死、消化管出血、出血性腸炎、偽膜性大腸炎、麻痺性イレウス

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			脳梗塞、肺梗塞、血栓・塞栓症、心筋梗塞、うっ血性心不全、溶血性尿毒症症候群 急性呼吸窮迫症候群、DIC、急性膀胱炎、難聴、皮膚炎、放射線肺炎、放射線食道炎 脊髄症
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	<b>AADC-0194</b>	<b>nab-paclitaxel + Carboplatin</b>	アブラキサン 100mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 4週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、脳神経麻痺、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	<b>AADC-0201</b>	<b>AVAPERL</b>	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 ペバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週毎4コース後 SDもしくはresponse(+)なら維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 ペバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週毎PDになるまで継続 副作用: 腎機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
<b>肺癌(C34)</b> 局所進行非小細胞肺癌	<b>AADC-0202</b>	<b>S-1+CDDP+RT</b>	CDDP 60mg/m <sup>2</sup> day1 TS-1 1回40mg/m <sup>2</sup> 1日2回 day1~14 4週毎2コース施行中に放射線治療施行 1回2Gy 週5日 30回照射 計60Gy(6週間) 上記化学放射線療法終了後2週間後から CDDP 60mg/m <sup>2</sup> day1 TS-1 1回40mg/m <sup>2</sup> 1日2回 day1~14 4週毎2コース施行 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
<b>肺癌(C34)</b> EGFR遺伝子変異陽性の手術不能または再発 非小細胞肺癌	<b>AADC-0204</b>	<b>Afatinib</b>	Afatinib 1日1回40mg経口投与 患者の状態により適宜増減 1日50mgまで 副作用: 下痢、発疹、爪囲炎、口内炎、間質性肺炎、皮膚障害、肝機能障害 鼻出血、食欲減退、疲労、粘膜の炎症、体重減少、味覚異常 結膜炎、心障害
<b>肺癌(C34)</b>	<b>AADC-0242</b>	<b>Durvalumab</b>	Durvalumab 10mg/kg day1 2週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
<b>肺癌(C34)</b> 小細胞肺癌	<b>AADC-0010</b>	<b>UFT(UFTE)</b>	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 小細胞肺癌	<b>AADC-0023</b>	<b>CBDCA+ETP療法(CE)</b>	VP-16 80mg/m <sup>2</sup> day1~3 CBDCA 目標AUC=5/body day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			3~4週ごと 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
<b>肺癌(C34)</b> 小細胞肺癌	AADC-0024	CPT-11+ CDDP療法(IP)	CDDP 60mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11 60mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振 末梢神経障害、脱毛、
<b>肺癌(C34)</b> 小細胞肺癌	AADC-0025	CPT-11	CPT-11 100mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 1週間隔で3回投与、2週休薬 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎
<b>肺癌(C34)</b> 小細胞肺癌	AADC-0100	PE(CDDP+ETP)+IMRT療法	CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~3 3~4週ごと 4コース 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
<b>肺癌(C34)</b>	AADC-0137	AMR	AMR 35~40mg/m <sup>2</sup> 3日間連続投与 3週ごと 3~6コース 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱
<b>肺癌(C34)</b>	AADC-0145	GC療法	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8 CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 4~6コース 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 クリゾチニブ 1回250mgを1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈 血液障害、心不全、発疹、便秘、口内炎、悪心 腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性
<b>肺癌(C34)</b> ALK陽性・ROS1陽性肺癌	AADC-0176	Crizotinib	副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 クリゾチニブ 1回250mgを1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈 血液障害、心不全、発疹、便秘、口内炎、悪心 腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性
<b>肺癌(C34)</b> CPT-11が使用できない進展型小細胞肺癌	AADC-0177	CDDP+VP-16	CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~3 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
<b>肺癌(C34)</b>	AADC-0210	Alectinib	アレクチニブ 1回300mg1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、骨髄抑制、消化管穿孔 血栓塞栓症、味覚異常、発疹、便秘、口内炎、悪心 腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性
<b>肺癌(C34)</b> EGFR遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0211	Erlotinib+Bevacizumab併用療法	ベバシズマブ 15mg/kg 3週間毎 エルロチニブ 100~150mg 1日1回経口投与 副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、肝機能障害、神経毒性、食欲減退 口内炎、嘔吐、高血圧、脱毛、関節痛、疲労、倦怠感、卵巣機能不全 重大な副作用: ショック、アナフィラキシー、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血 血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧クレーゼ、可逆性後白質脳症症候群 ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症、うっ血性心不全、間質性肺炎 血栓性微小血管症、
<b>肺癌(C34)</b> 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 1回240mg 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフルエンザ様反応



がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌(C34)	AADC-0231	Osimertinib	タグリッソ 1日1回80mg 副作用: 発疹、ざ瘡、下痢、皮膚乾燥、爪の障害、間質性肺炎、QT間隔延長 骨髄抑制、肝機能障害
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0232	RAM+DTX	RAM 10mg/kg day1 3週ごと DTX 60mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、
肺癌(C34) PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 PD-L1陽性の未治療非小細胞肺癌	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムプロリズマブ 1回200mg 3週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
肺癌(C34)	AADC-0237	Ceritinib	セリチニブ 1日1回750mg空腹時に経口投与 副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 高血糖、眼障害、皮下組織障害、胃腸障害、疲労 腎及び尿路障害
肺癌(C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0241	Atezolizumab	アテゾリズマブ 1200mg day1 3週ごと 副作用: 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌(C34)	AADC-0243	Lorlatinib	ロルラチニブ 1日1回100mgを経口投与 副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 膵炎、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症 末梢性ニューロパシー
肺癌(C34) 進行性非扁平上皮非小細胞肺癌	AADC-0245	CBDCA+PEM+Pembrolizumab→PEM+Pembrolizumab	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌(C34) 扁平上皮癌	AADC-0246	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab→Pembrolizumab	アブラキササン 100mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 Pembrolizumab 200mg/body day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			3週毎4コース後 維持療法へ
			維持療法
			Pembrolizumab 200mg/body day1
			3週毎
			副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
			食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー
			間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群
			急性腎不全、白質脳症、
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病
			膝炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
<b>肺癌(C34)</b>	<b>AADC-0247</b>	<b>CBDCA+PTX+Bevacizumab+Atezolizumab→Bevacizumab+Atezolizumab維持療法</b>	
非扁平上皮非小細胞肺癌			PTX 200mg/m <sup>2</sup> day1
			CBDCA 目標AUC=6 day1
			ベバシズマブ 15mg/kg day1
			アテゾリズマブ 1200mg/body day1
			3週毎4-6コース後 維持療法へ
			維持療法
			ベバシズマブ 15mg/kg day1
			アテゾリズマブ 1200mg/body day1
			3週毎
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐
			疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢
			間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膝炎、1型糖尿病
			甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎
			髄膜炎、神経障害
<b>肺癌(C34)</b>	<b>AADC-0254</b>	<b>CBDCA+VP-16+Atezolizumab f/b Atezolizumab</b>	
小細胞肺癌			VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~3
			CBDCA 目標AUC=5/body day1
			アテゾリズマブ 1200mg/body day1
			3週毎4コース後 維持療法へ
			維持療法
			アテゾリズマブ 1200mg/body day1
			3週毎
			副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
			疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢
			間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膝炎、1型糖尿病
			甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎
			髄膜炎、神経障害
<b>骨髄腫(C42)</b>	<b>AADC-0057</b>	<b>MP療法</b>	
			L-PAM 8mg/m <sup>2</sup> day1~4
			PSL 50mg/m <sup>2</sup> day1~4
			1クール:2週
			副作用: 下痢、口内炎、粘膜炎、悪心・嘔吐、肝機能障害
<b>骨髄腫(C42)</b>	<b>AADC-0058</b>	<b>VAD療法</b>	
			VCR 0.4mg/day day1~4
			DXR 9mg/m <sup>2</sup> day1~4
			DXM 40mg/day day1~4 day9~12 day9~12 day17~20
			副作用: 末梢神経障害、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、骨髄抑制、悪心・嘔吐、

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			口内炎、心電図異常
<b>骨髄腫 (C42)</b>	<b>AADC-0161</b>	<b>Bortezomib</b>	ボルテゾミブ 3週毎 副作用: 肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害
			1.3mg/m <sup>2</sup> 1日1回 day1,4,8,11
<b>骨髄腫 (C42)</b>	<b>AADC-0165</b>	<b>Bortezomib+Dexamethasone</b>	ボルテゾミブ デキサメタゾン 3週毎 副作用: 肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、血管浮腫 不眠症、無力症、疲労、錯覚症、筋痙攣、高血糖 誘発感染症、続発性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍 骨粗鬆症、霧視、紅斑、味覚異常、血栓塞栓症、緑内障、
			1.3mg/m <sup>2</sup> 1日1回 day1,4,8,11 20mg 1日1回 day1,2,4,5,8,9,11,12
<b>骨髄腫 (C42)</b> 原発性マクログロブリン血症	<b>AADC-0218</b>	<b>DRC療法</b>	デキサメタゾン リツキシマブ シクロホスファミド 3週毎6ヶ月間 副作用: アナフィラキシー様症状、腫瘍崩壊症候群、肝機能障害、 皮膚粘膜症状、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症 骨髄抑制、間質性肺炎、心障害、消化管穿孔、イレウス、 SIADH 横紋筋融解症、悪心・嘔吐、脱毛、色素沈着、食欲不振 口内炎、不眠、高血糖
			20mg 点滴 day1 375mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1 200mg/m <sup>2</sup> 経口 day1~5
<b>悪性軟部腫瘍 (C49)</b>	<b>AADC-0199</b>	<b>Pazopanib</b>	パゾパニブ 副作用: 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
			1日1回800mg 経口投与
<b>乳癌 (C50)</b> 内分泌療法 閉経前	<b>AADC-0027</b>	<b>Tamoxifen</b>	TAM 1日1回20mg 副作用: 無月経、月経異常、悪心・嘔吐、食欲不振
<b>乳癌 (C50)</b> 内分泌療法 閉経前	<b>AADC-0069</b>	<b>Zoladex</b>	ゴゼリン 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
			4週に1回3.6mgを皮下投与
<b>乳癌 (C50)</b> 内分泌療法 閉経前	<b>AADC-0070</b>	<b>Zoladex LA</b>	ゴゼリン 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
			10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与
<b>乳癌 (C50)</b> 内分泌療法 閉経前	<b>AADC-0094</b>	<b>Leuprorelin</b>	リュープロレリン 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加
			4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり
<b>乳癌 (C50)</b> 内分泌療法 閉経前	<b>AADC-0095</b>	<b>Leuprorelin +TAM療法</b>	リュープロレリン 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態
			4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり TAM 1日1回20mg

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、無月経、月経異常
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0096	Leuprorelin + Femara療法	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり
			レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態
			熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、関節痛、発疹、掻痒感、血栓症、塞栓症
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0097	Femara	レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0030	Arimidex	アナストロゾール 1日1回 1mg 副作用: ほてり、嘔気、脱毛、性器出血
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0031	Aromasin	エキセメスタン 1日1回 25mg 副作用: ほてり、多汗、高血圧、めまい、悪心、疲労
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0032	Fareston	トレミフェン 1日1回40mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0033	high dose Fareston	トレミフェン 1日1回120mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0034	Hysron-H	MPA 1日600から1200mg 分3 副作用: 体重増加、満月様顔貌、子宮出血、浮腫、血栓症、月経異常
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50 mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0035	Xeloda	カペシタビン 1日2回 3週連続投与 1週休薬 体表面積 1.31㎡未満 900mg/回 1.31から1.64㎡未満 1200mg/回 1.64㎡以上 1500mg/回 副作用: 手足症候群、骨髄抑制
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0036	weekly PTX	PTX 100mg/㎡ 6週投与2週休薬 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0038	tri-weekly DTX	DTX 60~75mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0040	FEC100療法	5-FU 500mg/㎡ day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			EPI 100mg/m <sup>2</sup> day1
			CPA 500mg/m <sup>2</sup> day1
			3週毎
			副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎
乳癌(C50)	AADC-0042	weekly Trastuzumab	
化学療法			トラスツズマブ 初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg
			毎週投与
			副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌(C50)	AADC-0043	bi weekly Trastuzumab	
化学療法			トラスツズマブ 4mg/kg day1
			2週毎
			副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌(C50)	AADC-0044	bi weekly PTX + Trastuzumab療法	
化学療法			PTX 80mg/m <sup>2</sup> day1
			トラスツズマブ 4mg/kg day1
			2週毎
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛 関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒 アントラサイクリン系・タキサン系無効例
乳癌(C50)	AADC-0045	VNR	
化学療法			VNR 25mg/m <sup>2</sup> 1週間間隔で2回投与 1週休薬
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎 電解質異常
乳癌(C50)	AADC-0046	VNR + Trastuzumab療法	
化学療法			VNR 25mg/m <sup>2</sup> day1 2回投与1週休薬
			トラスツズマブ 2mg/kg day1 毎週投与 (初回は4mg/kg)
			3週毎
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎 電解質異常、悪寒
乳癌(C50)	AADC-0087	tri-weekly Trastuzumab	
化学療法			トラスツズマブ 初回8mg/kg day1
			2回目以降 6mg/kg day1
			3週毎
			副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌(C50)	AADC-0088	weekly trastuzumab + PTX療法	
化学療法			PTX 80mg/m <sup>2</sup> day1
			トラスツズマブ 2mg/kg day1
			毎週投与
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛 関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒
乳癌(C50)	AADC-0129	Tykerb + Xeloda 療法	
化学療法			タイケルブ 1回1250mg 1日1回 連日投与
			カペシタビン 1回1000mg/m <sup>2</sup> 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、下痢、口内炎、倦怠感、嘔気・嘔吐
乳癌(C50)	AADC-0130	DTX+Cyclophosphamide療法	
化学療法			DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1
			CPA 500~600mg/m <sup>2</sup> day1
			3週毎
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌(C50)	AADC-0131	DTX +Xeloda療法	
化学療法			DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎
			カペシタビン 1回1250mg/m <sup>2</sup> 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
<b>乳癌(C50)</b> 化学療法	<b>AADC-0132</b>	<b>DTX+tri-weekly Trastuzumab 療法</b>	肝機能障害、腎機能障害、手足症候群 DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 トラスツズマブ 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
<b>乳癌(C50)</b> 化学療法	<b>AADC-0144</b>	<b>XELODA + Trastuzumab療法</b>	カペシタビン 1回1250mg/m <sup>2</sup> 1日2回 2週連続投与 1週休薬 トラスツズマブ 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、手足症候群
<b>乳癌(C50)</b> 進行・再発乳癌 化学療法	<b>AADC-0150</b>	<b>tri-weekly Abiraterone</b>	アブラキサン 1回 260mg/m <sup>2</sup> 3週毎 副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
<b>乳癌(C50)</b> アントラサイクリン及びタキサンを含む抗がん剤治療後 再発・転移乳癌 化学療法	<b>AADC-0166</b>	<b>Eribulin</b>	ハラヴエン 1.4mg/m <sup>2</sup> day1、8 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、脱毛、疲労、食欲減退、発熱、便秘、下痢、嘔吐 口内炎、味覚異常、末梢神経障害、肝機能障害、間質性肺炎
<b>乳癌(C50)</b> 内分泌療法 閉経後	<b>AADC-0167</b>	<b>Fulvestrant</b>	フルベストラント 1回2筒(1筒250mg) 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与 初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症
<b>乳癌(C50)</b>	<b>AADC-0172</b>	<b>CMF(経口法)</b>	MTX 40mg/m <sup>2</sup> day1、8 5-FU 600mg/m <sup>2</sup> day1、8 CPA 1回50mg 1日2回 day1~15 4週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
<b>乳癌(C50)</b>	<b>AADC-0173</b>	<b>CMF(静注法)</b>	MTX 40mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU 600mg/m <sup>2</sup> day1 CPA 600mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
<b>乳癌(C50)</b>	<b>AADC-0174</b>	<b>Bevacizumab + PTX療法</b>	PTX 90mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 ベバシズマブ 10mg/kg day1,15 4週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制 末梢神経障害、関節痛、筋肉痛、下痢、高血圧、蛋白尿 出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症候群、創傷治癒遅延、味覚異常、爪の障害
<b>乳癌(C50)</b>	<b>AADC-0190</b>	<b>Gemcitabine</b> 手術不能又は再発乳癌	GEM 1250mg/m <sup>2</sup> day1,8 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、心筋梗塞、うっ血性心不全 肺水腫、気管支痙攣、ARDS、腎不全、溶血性尿毒症症候群
<b>乳癌(C50)</b> 進行・再発乳癌 補助化学療法	<b>AADC-0195</b>	<b>THP療法</b>	用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/bod day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 DTX 75mg/m <sup>2</sup> day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			2クール目 Pertuzumab 420mg/bod day1 Trastuzumab 6mg/kg day1 DTX 75mg/m <sup>2</sup> day1 1クール=3週間 DTXを6サイクルまで投与し、7サイクル以降が主治医の判断で継続
			副作用 下痢、脱毛、爪の異常、倦怠感、嘔気・嘔吐、しびれ、発疹、骨髄抑制 インフュージョンリアクション、うつ血性心不全
乳癌(C50)	AADC-0203	Everolimus	Everolimus 1日1回10mgを経口投与(ホルモン療法併用) 副作用: 口内炎、発疹、疲労、食欲減退、下痢、味覚異常、悪心 感染症、体重減少、貧血、鼻出血、高血糖、血小板減少 掻痒症
乳癌(C50)	AADC-0207	P/T+Eribulin	Pertuzumab 初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 Trastuzumab 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1 Eribulin 1.4mg/m <sup>2</sup> day1, day8 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、脱毛、倦怠感 骨髄抑制、悪心、爪の異常、ニューロパシー、発疹、間質性肺炎 流涙増加、肝機能障害、アナフィラキシー、浮腫、疼痛
乳癌(C50)	AADC-0209	T-DM1	T-DM1 3.6mg/kg day1 3週ごと 副作用: 倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害
乳癌(C50)	AADC-0217	EC療法	EPI 100mg/m <sup>2</sup> day1 CPA 600mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、
乳癌(C50)	AADC-0221	AC療法	ADM 60mg/m <sup>2</sup> day1 CPA 600mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 口内炎、心電図異常、出血性膀胱炎、下痢、肝機能障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、急性腎不全 アナフィラキシー、排尿障害
乳癌(C50)	AADC-0226	Leuprorelin Pro	Leuprorelin Pro22.5mg 24週毎皮下注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0234	TC+tri weekly Trastuzumab	DTX 75mg/m <sup>2</sup> day1 CPA 600mg/m <sup>2</sup> day1 トラスツズマブ <sup>®</sup> 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌(C50)	AADC-0238	Palbociclib + Letrozole	バルボシクリブ 1日1回125mg 3週連続投与1週休薬



がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			レトロゾール 1日1回2.5mg 連続投与 4週毎 副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎
乳癌(C50)	AADC-0239	Palbociclib + fulvestrant	パルボシクリブ 1日1回125mg 3週連続投与1週休薬 フルベストラント 1回2筒(1筒250mg) 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与 day1, day15 その後はサイクル1の1日目から換算して18日(±7日)毎 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎
乳癌(C50)	AADC-0244	Abemaciclib	アベマシクリブ 1回150mgを1日2回経口投与 副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、下痢、間質性肺炎 静脈血栓塞栓症、感染症、悪心、嘔吐 疲労、脱毛症 血清クレアチニン上昇
乳癌(C50)	AADC-0248	Olaparib	オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与 副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛
乳癌(C50)	AADC-0249	nab-PTX+trasutuzumab	nab-PTX 1回 260mg/m <sup>2</sup> 3週毎 トラスツズマブ 初回8mg/kg day1 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢
乳癌(C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0255	nab-PTX+Atezolizumab	Atezolizumab 840mg/回 点滴静注 day1, day15 nab-PTX 100mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 day1, day8, day15 その後13日間休薬 28日で1コース 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
乳癌(C50)	AADC-0258	DD-EC	EPI 90mg/m <sup>2</sup> day1 CPA 600mg/m <sup>2</sup> day1 ベグフィルクラスチム 3.6mg day2 2週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、
子宮頸癌(C53)	AADC-0082	NDP+CPT-11療法	CPT-11 60mg/m <sup>2</sup> day1, 8 ネダプラチン 100mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			副作用: 下痢、悪心・嘔吐、骨髄抑制、腎機能障害、肝機能障害
子宮体癌(C54)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 180mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 3~4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害
子宮体癌(C54)	AADC-0080	DTX+CBDCA療法(DC)	DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
子宮体癌(C54)	AADC-0081	CPA+ADM+CDDP療法(CAP)	CPA 500mg/m <sup>2</sup> day1 DXR 50mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 50mg/m <sup>2</sup> day1 4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感
卵巣癌(C56)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 180mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 3~4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害
卵巣癌(C56)	AADC-0080	DTX+CBDCA療法(DC)	DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
卵巣癌(C56)	AADC-0081	CPA+ADM+CDDP療法(CAP)	CPA 500mg/m <sup>2</sup> day1 DXR 50mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 50mg/m <sup>2</sup> day1 4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感
卵巣癌(C56)	AADC-0133	DOXIL	DXR 50mg/m <sup>2</sup> を1mg/分で静注 day1 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、アナフィラキシー用症状、手足症候群、口内炎、肝機能障害、悪心、食欲不振、発疹、疲労、体重減少、心筋障害
卵巣杯細胞性悪性腫瘍(C56)	AADC-0075	EP療法	VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~5 CDDP 20mg/m <sup>2</sup> day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
卵巣杯細胞性悪性腫瘍(C56)	AADC-0083	BEP療法	BLM 30mg/body day2,9,16 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~5 CDDP 20mg/m <sup>2</sup> day1~5 1クール:3週 副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振、体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、
前立腺癌(C61)	AADC-0038	tri-weekly DTX	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
前立腺癌(C61)	AADC-0064	Prostal	
			クロルマジン 副作用: 1回50mg1日2回 インポテンツ、浮腫、体重増加、女性化乳房
前立腺癌(C61)	AADC-0065	Casodex	
			ビカルタミド 副作用: 1回80mg1日1回 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害、勃起力低下
前立腺癌(C61)	AADC-0066	Odyne	
			フルタミド 副作用: 1回125mg 1日3回 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐
前立腺癌(C61)	AADC-0067	Estracyt	
			エストラムスチン 副作用: 1回280mg 1日2回 女性化乳房、食欲不振、浮腫、貧血、肝機能異常
前立腺癌(C61)	AADC-0068	Leuplin	
			リュープロレリン 副作用: 4週に1回3.75mgを皮下投与 肝機能障害、ほてり、熱感
前立腺癌(C61)	AADC-0070	Zoladex LA	
			ゴセリン 副作用: 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌(C61)	AADC-0103	多剤ホルモン療法無効前立腺癌 Prosexol	
			エチニルエストラジオール 副作用: 1回0.5~1.0mg 1日3回 血栓症、心不全、狭心症、発疹、肝機能障害、血圧上昇、電解質異常
前立腺癌(C61)	AADC-0124	Casodex + ZoladexLA 療法	
			副作用: ビカルタミド 1回80mg1日1回 ゴセリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害
前立腺癌(C61)	AADC-0125	Casodex + Leuplin 療法	
			副作用: ビカルタミド 1回80mg1日1回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 ほてり、熱感
前立腺癌(C61)	AADC-0127	Odyne + ZoladexLA 療法	
			副作用: フルタミド 1回125mg 1日3回 ゴセリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐 代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌(C61)	AADC-0187	Degarelix	
			副作用: デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降80mgを腹部1箇所に皮下投与 4週毎 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌(C61)	AADC-0128	Odyne + Leuplin 療法	
			副作用: フルタミド 1回125mg 1日3回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐、ほてり、熱感

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
前立腺癌(C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0205	Enzalutamide	エンザルタミド 1回160mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、悪心、食欲減退、無力症、痙攣発作、下痢、
前立腺癌(C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0208	Abiraterone	Abiraterone 1回1000mg 1日1回 経口投与 連日 プレドニン 1回5mg 1日2回 経口投与 連日 副作用: 肝機能障害、心障害、疲労、ほてり、悪心・嘔吐、低カリウム血症 高血圧、消化器症状、高脂血症
前立腺癌(C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0224	Cabazitaxel	Cabazitaxel 20~25mg/m <sup>2</sup> day1 Pegfilgrastin 3.6mg day2 3週毎 副作用: 好中球減少症、骨髄抑制、疲労、悪心、下痢、食欲減退 貧血、腎不全、消化管出血、アナフィラキシーショック 心不全、末梢神経障害、DIC、皮膚粘膜眼症候群、心タンポナーデ 心筋梗塞、静脈血栓塞栓症、間質性肺炎、口内炎、SIADH
前立腺癌(C61)	AADC-0226	Leuprorelin Pro	Leuprorelin Pro22.5mg 24週毎皮下注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症
前立腺癌(C61)	AADC-0250	Degarelix(12週毎)	デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降は初回投与4週間後より480mgを維持用量として 腹部2箇所に皮下投与し、12週間間隔で投与を繰り返す。 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌(C61)	AADC-0251	Apalutamide	アパルタミド 1回240mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、皮疹、甲状腺機能低下症、掻痒症、体重減少 痙攣発作、心房細動、心筋梗塞、悪心、下痢
精巣腫瘍(C63)	AADC-0074	BEP療法	BLM 30mg/body day1.8.15 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~5 CDDP 20mg/m <sup>2</sup> day1~5 1クール:3週 副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、
精巣腫瘍(C63)	AADC-0075	EP療法	VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~5 CDDP 20mg/m <sup>2</sup> day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
精巣腫瘍(C63) セミノーマ	AADC-0171	CBDCA	CBDCA AUC=7 単回投与 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌(C64)	AADC-0076	Sumiferon	IFN-α 1日1回300万~600万IU 連日または週1~3回 副作用: 発熱、全身倦怠感、食欲不振、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌(C64)	AADC-0077	Imunace	テセロイキン 1日1回70万単位 連日 副作用: 発熱、悪寒、倦怠感、食欲不振、悪心・嘔吐、好酸球増多、肝機能障害、浮腫
腎癌(C64)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			副作用： 骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、菌肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
<b>腎癌(C64)</b> 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用： 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クレーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
<b>腎癌(C64)</b> 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	AADC-0169	Everolimus	Everolimus 10mg/day 連日経口投与 副作用： 口内炎、発疹、貧血、疲労、下痢、無力症、食欲減退、高コレステロール血症 悪心、粘膜の炎症、嘔吐、末梢性浮腫、高トリグリセリド血症、咳嗽、掻痒症 感染症、皮膚乾燥、鼻出血、呼吸困難、味覚異常、間質性肺炎、腎不全 高血糖、アナフィラキシー様症状、急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、心嚢液貯留 進行性多巣性白質脳症、BKウイルス腎症、血栓性微小血管障害、肺胞蛋白症
<b>腎癌(C64)</b>	AADC-0178	Temsirolimus	テムシロリムス 25mgを1週間に1回点滴 副作用： 発疹、口内炎、食欲不振、肝機能障害、高血糖、間質性肺疾患 infusion reaction、脂質代謝異常、創傷治癒遅延、腎不全 消化管穿孔、心嚢液貯留、胸水、痙攣、脳出血、感染症 皮膚粘膜眼症候群、横紋筋融解症、骨髄抑制
<b>腎癌(C64)</b> 進行再発腎癌	AADC-0183	Axitinib	アキシチニブ 1回5mg1日2回経口投与 患者の状態により増減可、増量は1回10mgまで 副作用： 高血圧、甲状腺機能障害、創傷治癒遅延、蛋白尿、手足症候群 肝機能障害、下痢、疲労、悪心嘔吐、発声障害、無力症、体重減少 粘膜炎症、口内炎、味覚異常、鼻出血、
<b>腎癌(C64)</b>	AADC-0199	Pazopanib	パゾパニブ 1日1回800mg 経口投与 副作用： 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
<b>腎癌(C64)</b>	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg 2週間隔 副作用： 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
<b>腎癌(C64)</b>	AADC-0252	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab 240mg/body Ipilimumab 1mg/kg 3週毎4コースまで 5コースから Nivolumab 240mg/body 2週毎継続 副作用： 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
<b>腎う癌(C65)</b>	AADC-0121	GC療法	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 CDDP 70mg/m <sup>2</sup> day2 1クール:4週 副作用： 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
<b>尿管癌(C66)</b>	AADC-0121	GC療法	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8.15
			CDDP 70mg/m <sup>2</sup> day2
			1クール:4週
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
膀胱癌(C67)	AADC-0012	Furtulon	5'-DFUR 800-1200mgを3-4回に分けて服用
			副作用: 食欲不振、下痢、白血球減少
膀胱癌(C67)	AADC-0071	Epirubicin 膀胱内注入	EPI 40mgを週1回膀胱内へ注入 10回
			副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛
膀胱癌(C67)	AADC-0072	Immunobladder 膀胱内注入	BCG 40mgまたは80mgを週1回膀胱内へ注入 10回
			副作用: BCG感染、排尿痛、頻尿、肉眼的血尿、肝機能障害、発熱、
膀胱癌(C67)	AADC-0121	GC療法	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8.15
			CDDP 70mg/m <sup>2</sup> day2
			1クール:4週
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
悪性膠芽腫、乏突起神経膠腫(C71)	AADC-0078	IFNβ+MCNU+IMRT(IMR療法)	IFNβまたはフェロン 300万単位 5投2休(5週間)、1回/週(6週目以降)
			サイメリン 1mg/kg 2ヶ月に1回
			放射線照射
			副作用: 発熱、骨髄抑制、蛋白尿、食欲不振、悪心嘔吐
悪性神経膠腫(C71)	AADC-0104	Temodal	テモダール 初発)放射線照射との併用
			テモゾロミドとして1回75mg/m <sup>2</sup> 1日1回連日42日間経口投与し4週間休薬
			その後本剤単独にて、テモゾロミドとして1回150mg/m <sup>2</sup> を1日1回連日5日間経口投与し、23日間休薬。28日間1クール
			再発)
			テモゾロミドとして1回150mg/m <sup>2</sup> 1日1回連日5日間経口投与し23日間休薬
			28日間1クール
			副作用: 放射線照射との併用 脱毛、悪心・嘔吐、疲労
			併用後の単独投与時 疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘
悪性神経膠腫(C71)	AADC-0197	BV+RT/TMZ療法	ベバシズマブ 1回10mg/kgを2週間間隔で計4回点滴静注
			テモダール 1回75mg/m <sup>2</sup> 1日1回連日経口投与
			放射線照射 2Gy/日 週5日 総線量60Gy
			その後
			ベバシズマブ 1回10mg/kgを2週間間隔点滴静注
			テモダール 1回150mg~200mg/m <sup>2</sup> 1日1回連日5日間経口投与し23日間休薬
			28日間1クール
			その後
			ベバシズマブ 1回15mg/kgを3週間間隔点滴静注 PDになるまで
			副作用: 脳出血、粘膜皮膚出血、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、創傷治癒遅延
			骨髄抑制、感染症、高血圧、蛋白尿、可逆性後白質脳症候群、消化管穿孔
			うつ心性心不全、疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘
悪性神経膠腫(C71)	AADC-0198	Gliadel	ギリアデル 腫瘍切除腔の大きさや形状に応じて、8枚または適宜減じた枚数を
			脳腫瘍切除術時の切除面を被覆するように留置
			副作用: 脳浮腫、発熱、リンパ球数減少、片麻痺、悪心、嘔吐、食欲減退
			頭痛、肝機能異常、痙攣、創傷治癒不良、血栓塞栓症
悪性リンパ腫(C72)	AADC-0116	髄注MTX+PSL療法	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			MTX 15mg PSL 20mg 髄液中悪性リンパ腫細胞が陰性化するまで2回/週 繰り返し施行 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、
悪性リンパ腫(C72)	AADC-0118	high dose MTX	MTX 3.5g/m <sup>2</sup> 24時間点滴 LV 15mg/body 静注 LVはMTX終了12時間後から6時間毎に投与 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、 肝機能障害、食欲不振
甲状腺癌(C73)	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
甲状腺癌(C73)	AADC-0222	Lenvatinib	用法・用量 1回24mg 1日1回 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0048	CHOP療法	CPA 750mg/m <sup>2</sup> day1 DXR 50mg/m <sup>2</sup> day1 VCR 1.4mg/m <sup>2</sup> day1 PSL 100mg/body day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0049	R-CHOP療法	リツキシマブ 375mg/m <sup>2</sup> (CHOP療法の前日) CPA 750mg/m <sup>2</sup> day1 DXR 50mg/m <sup>2</sup> day1 VCR 1.4mg/m <sup>2</sup> day1 PSL 100mg/body day1~5 1クール:3週 副作用: 全身浮腫、呼吸障害、発熱、悪寒、頭痛、血圧上昇、発疹、骨髄抑制、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎、心毒性、末梢神経障害、肝障害、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0236	High dose MTX + High dose Ara-C	MTX 200mg/m <sup>2</sup> day1 MTX 800mg/m <sup>2</sup> 持続 day1 ソル・メルコート 50mg/body day1~3 キロサイト 6000mg/m <sup>2</sup> /日 day2~3 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、 肝機能障害、食欲不振、間質性肺炎、急性呼吸促進症候群 中枢神経障害、代謝異常
原発不明癌(C80)	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/m <sup>2</sup> を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m <sup>2</sup> を2週間に1回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感



がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等